



Getingar

(الزنبور) الدبور)

- يمكن التعرف على الزنابير (Getinger) من خلال شكلها ، حيث يكون ظهرها مخطط باللونين الأسود والأصفر ، وتختلف عن النمل من خلال الابرّة الموجودة في مؤخرتها ، والتي بواسطتها تقوم بعملية اللسع لعدة مرات .

- تقوم الملكات (Drottningar) في أواسط شهر نيسان بالبحث عن مكان جديد لبناء مستعمرات (خلايا ، Boet) جديدة .

- المستعمرة (البناء) يتكون من 10 - 20 خلية (cell) ، حيث تضع الملكة بيضة في كل خلية ، وتفقس هذه البيوض في أواسط شهر مايس ، وينتج عنها يرقات (Larverna) تتم تغذيتها من قبل الملكة الى أن يصبحن في نهاية شهر مايس على شكل عاملات (arbetas) ، واللاتي تقمن بدورهن في التغذية . بينما تقوم الملكة بوضع البيوض من جديد .

- يمكن للنمل والزنابير ان يصيروا مشكّلة لنا خلال فترة الصيف . ما بين شمري تموز وأب .

- عند حلول فصل الخريف تبدأ الملكة بوضع بيوضاً جديدة والتي ستصير فيما بعد ملكات جديدة وذكورا .

وفي فصل الشتاء تموت كل الملكات القديمات ، الذكور ، والعاملات ، فيما تقوم الملكات الجديديات ببناء المستعمرات الجديدة في السنة التالية .

في السويد نستخدم كل المستعمرات لسنة واحدة فقط ولا يتم استخدامها في السنة التالية .

- يمكن التخلص من المستعمرات . في بداية كل موسم ، ما بين شمري نيسان وحزيران ، وذلك بواسطة عصا أو ما شابه ذلك . وحينها تكون مستعمرة صغيرة . و في نهاية فصل الخريف ، أو بداية فصل الشتاء تكون المستعمرات خالية من الزنابير .

(الزنابير الأرضية) Jordgetinger :

هي الزنابير التي تضع مستعمراتها في ثقوب تحت الارض . وإذا ما شككت بوجوده فعليك التأكد من أن مناك مدخل واحد أو أكثر لهذه الثقوب (المستعمرات) .

للزنابير الأرضية مدخل واحد فقط ، فإن وجد أكثر من مدخل لهذه الثقوب ، وهذا يعني انها عبارة عن بيوت لحشرات اخرى (steklar) غير ضارة أو مؤذية فلاداعي لمكافحتها .

من اك حشرات اخرى تشبه الزنابير ولكنها غير مؤذية ، على سبيل المثال ذباب
الورود (blomflugor) (ونوع من انواع الفراشات) Fjärilar .)

المنمل العادي والمنمل الطنان n□ j I الله يلعبان دوراً أساسياً في تلقيح النباتات
. } 5 } f 1 5 1 5 3 } + @ 1 5 1 5 f + 5 }

SVEA Miljö & Hygien AB
Kundtjänst
Tel: 08-626 83 50, 020-47 45 00
kundtjanst@sveamiljo.se

www.sveamiljo.se